

Ibalgin 200 mg, 12 tbl

LÉČIVÁ LÁTKA

Ibuprofen 200 mg v 1 potahované tabletě.

Léková forma: potahované tablety

Velikost balení: 12

Vhodné pro: pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

KDY POUŽÍT?

- Bolest hlavy
- Bolest zad
- Bolest zubů
- Bolest svalů a kloubů
- Menstruační bolest

DÁVKOVÁNÍ

Děti 6–12 let: 1 tableta 2–3× denně, interval mezi jednotlivými dávkami 6–8 hodin. U dětí s hmotností do 30 kg nepřekračujte denní dávku 2 tablety (400 mg) během 24 hodin.

Dospělí a dospívající od 12 let: 1–2 tablety 3x denně. Interval mezi jednotlivými dávkami alespoň 4 hodiny.

Nepřekračujte denní dávku 6 tablet během 24 hodin, neurčí-li lékař jinak.

Nástup účinku proti bolesti: 30 minut, trvá 4-6 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Těhotné ženy mohou užívat Ibalgin® 200 pouze v 1. a 2. trimestru těhotenství, a to jen na výslovné doporučení lékaře.

Kojící ženy mohou užívat Ibalgin® 200 pouze po poradě s lékařem, a to pouze krátkodobě. Ibuprofen je považován za lék první volby k léčbě bolesti a zánětu u kojících matek.

Ibalgin® 200 je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
